

HƯỚNG DẪN SẢN PHẨM MỚI

- 1. Misung 15SC (Giáo sư cỏ)**
- 2. Dusan 240EC**
- 3. Gardona 250SL**
- 4. Kenbast 15SL Long (Lạc đà)**
- 5. Gussi Bastar 200SL (Voi rừng)**
- 6. Binhtox 3.8EC Gold**

1. MISUNG 15SC (GIÁO SƯ CỎ)

Hoạt chất: Mesotrione 15% w/w

Công dụng: trừ được cỏ lá rộng, lá hẹp, cỏ hòa bản trên cây bắp, mía. Trừ cỏ giai đoạn 5-20 ngày sau trồng (cỏ tầm 1-3 lá mầm)

HƯỚNG DẪN AN TOÀN SỬ DỤNG

An toàn sử dụng: Không hút thuốc, ăn hoặc uống trong khi sử dụng sản phẩm này. Khi tiếp xúc hoặc chuẩn bị thuốc: Tránh hít phải thuốc, tránh để thuốc tiếp xúc với miệng, da và mắt, mang bảo hộ lao động phù hợp. Sau khi sử dụng: Rửa chân tay và tắm rửa, rửa sạch trang bị bảo hộ lao động. Giữ kín bao gói gốc được dán nhãn. Không sử dụng lại bao gói này vì bất kỳ mục đích nào khác. Bỏ bao gói đã sử dụng đúng nơi quy định. Bao gói sau sử dụng phải được rửa 3 lần.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, xa tầm tay trẻ em, xa nguồn nước, thức ăn và động vật.
Sơ cấp cứu: Nếu bị dính hoặc bị bắn nhiều thuốc ngay lập tức cởi quần áo bị dính, rửa kỹ phần bị dính thuốc bằng nhiều nước. Trường hợp ngộ độc, cần đưa ngay nạn nhân đi cấp cứu, nhớ mang theo nhãn thuốc.

DIỆT SẠCH CỎ LÁ RỘNG, LÁ HẸP, CỎ HÒA BẢN



Ủy quyền: Anhui Shengdan Biochemical Co., Ltd.
Add: No 63, Wanghua East Street, Huayang Town, Wangjiang County, Anqing City, Anhui Province, China.
Đăng ký: Công ty CP BMC Việt Nam
ĐC: Lô MB 1-2, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An.
Đơn vị sản xuất: Xem trên phiếu KCS

Xuất xứ: China
Số ĐK: 7907/CNĐKT-BVTV
HSD: 02 năm kể từ NSX
NSX, ngày đóng gói: Xem trên bao bì
(Số lô SX: Xem trên bao bì, vỏ kiện)

MISUNG 15SC

THỂ TÍCH THỰC
450ml

LẮC KỸ CHAI TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

THUỐC TRỪ CỎ MISUNG 15SC

CẢNH BÁO:
Có thể có hại nếu nuốt, hít phải.
Có thể có hại khi tiếp xúc với da.



GIÁO SƯ CỎ®

Hoạt chất: Mesotrione 15% w/w + Special additives 85% w/w



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GIÁO SƯ CỎ là thuốc trừ cỏ chọn lọc, hậu nảy mầm sớm, có tác động tiếp xúc, nội hấp, trừ cỏ phổ rộng. Thuốc làm ức chế quá trình quang hợp của cây cỏ. Sau khi phun từ 3 - 5 ngày, cây cỏ bắt đầu có triệu chứng bạch tạng và chết gục sau khi phun 10 ngày. Hiệu quả cao với cỏ hàng niên và một số cỏ đa niên lá hẹp, lá rộng như cỏ chỉ, mần trâu, cỏ gấu, cỏ túc,... trong ruộng ngô, mía... Hiệu quả cao đối với các loại cỏ hòa bản, lá rộng.

Cây trồng	Cỏ hại	Liều lượng	Cách dùng
Mía	Cỏ hòa thảo, lá rộng	0.8 lít/ha.	Lượng nước phun từ 500 - 600 lít/ha.
Ngô (Bắp)		Pha 50 - 60ml/bình 20 lít Phun 3 bình cho 1.000m ² .	


- Trên **ngô (bắp)**, **mía** phun khi cỏ đã mọc nhưng còn nhỏ (1 - 5 lá).
- Với **bắp nếp**, **ngot**: Nên xịt dưới gốc, hạn chế xịt vào lá, nõn.
- Phun thuốc tốt nhất khi cây ngô từ 8 lá trở lên, có thể phun trùm lên cây ngô, hạn chế phun tập trung vào nõn ngô. Thuốc có thể làm cho lá bị vàng, trắng sau một thời gian ngắn cây ngô phục hồi và các lá ra sau sẽ xanh trở lại.
- **Thời gian cách ly:** Không xác định.

Nhãn hiệu "Giáo sư cỏ" đã được đăng ký SHTT.
Không sao chép dưới mọi hình thức.

Đơn vị phân phối:

TẬP ĐOÀN DELTA THỤY SĨ

ĐC: 41 Đường Số 6, Ấp 3, Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0901.496.213



167/2023-DT

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

2. Dusan 240EC

*Hoạt chất: **Lactofen 240g/L**

*Công dụng: Trừ cỏ lá rộng trên đậu nành, đậu phộng, củ đậu, khoai mì.

Phun phủ được lên cây trồng.

*Lưu ý: +**Riêng cây khoai mì hạn chế phun lên ngọn**, lá cây sẽ bị tấp khi dính thuốc

+ Có thể phun kết hợp **maruka và laoton để trừ cỏ lá hẹp**

HƯỚNG DẪN AN TOÀN SỬ DỤNG

An toàn sử dụng: Không hút thuốc, ăn hoặc uống trong khi sử dụng sản phẩm này. Khi tiếp xúc hoặc chuẩn bị thuốc: Tránh hít phải thuốc, tránh để thuốc tiếp xúc với miệng, da và mắt, mang bảo hộ lao động phù hợp. Sau khi sử dụng: Rửa chân tay và tắm rửa, rửa sạch trang bị bảo hộ lao động. Giữ kín bao gói gốc được dán nhãn. Không sử dụng lại bao gói này vì bất kỳ mục đích nào khác. Bỏ bao gói đã sử dụng đúng nơi quy định. Bao gói sau sử dụng phải được rửa lại 3 lần.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, xa tầm tay trẻ em, xa nguồn nước, thức ăn và động vật.

Sơ cấp cứu: Nếu bị dính hoặc bị bắn nhiều thuốc ngay lập tức cởi quần áo bị dính, rửa kỹ phần bị dính thuốc bằng nhiều nước. Trường hợp ngộ độc, cần đưa ngay nạn nhân đi cấp cứu, nhớ mang theo nhãn thuốc.



Xuất xứ: China.
Số đăng ký: 7910/CNĐKT-BVTV
Đơn vị đăng ký: Công ty CP BMC Vĩnh Phúc.
ĐC: Cụm KTXH, Xã Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
Đơn vị ủy quyền: Anhui Sida Pesticide Chemicals Co., Ltd.
Add: Fine Chemical Park, Wujiang Town, Hexian County
Anhui Province, China.
Đơn vị sản xuất: Xem trên phiếu KCS.
HSD: 2 năm kể từ NSX *NSX, ngày đóng gói: Xem trên bao bì
Số lô SX: Xem trên bao bì, vỏ kiện.

THỂ TÍCH THỰC: 450ml

THUỐC TRỪ CỎ

CẢNH BÁO:
Có thể có hại nếu hít, nuốt phải
Có thể có hại khi tiếp xúc với da

Dusan 240EC

Hoạt chất: Lactofen...240g/L

DIỆT SẠCH CỎ ĐẠI

PHUN PHỦ ĐƯỢC LÊN CÂY TRỒNG



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Thuốc trừ cỏ **Dusan 240EC** là thuốc trừ cỏ thế hệ mới, tiên tiến. Thuốc được hấp thụ nhanh qua lá, thân, rễ có vào mô thực vật làm mất diệp lục, phá hủy màng tế bào khiến cỏ bị héo và chết. Thuốc diệt trừ hữu hiệu các loại cỏ lá rộng như: Cỏ hời (lông hời), mắc cỡ (cây xấu hổ), rau sam, chua me, dền gai, cỏ cuc, cỏ đề, tầm bóp...

- Sau khi phun, lá cây trồng có thể bị tấp hoặc xoắn, cây sẽ phục hồi lại, ra lá mới bình thường sau 5 - 7 ngày. Không ảnh hưởng tới năng suất cây trồng.

Cây trồng	Đối tượng	Cách dùng
Đậu nành (đậu tương), đậu phộng (lạc), củ đậu, khoai mì (sắn).	Mắc cỡ (cây xấu hổ), rau sam, cỏ cuc, cỏ hời (lông hời), cỏ đề, chua me, dền gai, tầm bóp...	0.3 - 0.4 lít/ha. Pha 20 - 30ml / bình 20 lít nước. Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha.

LƯU Ý:

- Riêng với khoai mì, bà con nên dùng béc phun chùm, xịt tập trung phía dưới gốc mì. Hạn chế xịt lên ngọn. Lá cây có thể bị tấp khi dính thuốc. Lá mới, lộc non sẽ ra lại sau 5 - 7 ngày.

- Khi phun, có thể kết hợp với thuốc trừ cỏ **Maruka** hoặc **Laoton** để tăng cường hiệu quả quản trị cỏ dại lá hẹp. Không phun thuốc cho các cây trồng khác nếu chưa thử.

- Trước khi phun cần làm ẩm nền đất, phun khi trời mát, không có mưa.

- Thời gian cách ly: Không xác định.



Hợp tác và phân phối:
TẬP ĐOÀN DELTA THỤY SĨ
ĐC: 41 Đường Số 6, Ấp 3, Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh, TP. HCM
ĐT: 0901.496.213

QR

LẮC ĐỂU CHAI TRƯỚC KHI SỬ DỤNG



ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

+ Có thể phun kết hợp **maruka và laoton** để trừ cỏ lá hẹp

Ngày 27/01/2024

4. KENBAST 15SL Long (LẠC ĐÀ)

*Hoạt chất: + Glufosinate ammonium 150g/ l
+ Đóng NL lỏng - màu tím



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Kenbast 15SL là thuốc trừ cỏ không chọn lọc thể hệ mới có tác động tiếp xúc mạnh, diệt trừ các loại cỏ hàng niên và đa niên nhất là các loại cỏ khó trị như: Mần trâu, thài lài, cỏ chí, cỏ tranh, cỏ lá tre, cỏ củ...

CÂY TRỒNG	LOẠI CỎ	LIỀU LƯỢNG
CÀ PHÊ	Cỏ dại	Liều lượng: 4.0 lít/ha Pha 150 - 200 ml/bình 20 lít. Phun thuốc khi cỏ đang phát triển.

Lượng nước phun: 500 - 600 lít/ha.
Thời điểm: Phun tốt nhất vào giai đoạn cỏ đang phát triển xanh tốt (cao từ 10 - 25 cm).
Lưu ý: Pha thuốc với nước trong, không phun lên đất ngập nước hoặc đất quá khô. Phun 3 - 4 tiếng trước khi trời mưa. Không phun vào phần xanh của cây trồng.
Thời gian cách ly: Không xác định.

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO - DIỆT SẠCH CỎ

Đơn vị phân phối:
CÔNG TY CỔ PHẦN AGRISHOP
ĐC: Lũ M81-3, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An.
ĐT: 0834.888.539

THUỐC TRỪ CỎ
KENBAST 15SL LONG
HIỆU **LẠC ĐÀ**[®]

Thành phần: Glufosinate-ammonium 150 g/lit
Premium additives 850 g/lit + Total ingredients 1000 g/lit

DIỆT CỎ TẬN GỐC

CỎ BẮT ĐẦU CHẾT SAU 5 - 7 NGÀY PHUN THUỐC

Đặc trị: Mần trâu, cỏ tranh, cỏ gấu, cỏ vừng, cỏ chí, thài lài...

CẢNH BÁO:
Có thể có hại nếu nuốt, hít phải
Có thể có hại khi tiếp xúc với da.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN SỬ DỤNG:

- * **An toàn sử dụng:** Không hút thuốc, ăn hoặc uống trong khi sử dụng sản phẩm này. Khi tiếp xúc hoặc chuẩn bị thuốc: Tránh hít phải thuốc, tránh để thuốc tiếp xúc với miệng, da và mắt, mang bảo hộ lao động phù hợp. Sau khi sử dụng: Rửa chân tay và tắm rửa, rửa sạch trang bị bảo hộ lao động. Giữ kín bao gói gốc được dán nhãn. Không sử dụng lại bao gói này vì bất kỳ mục đích nào khác. Bỏ bao gói đã sử dụng đúng nơi quy định. Bao gói sau sử dụng phải được rửa 3 lần.
- * **Bảo quản:** Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, xa tầm tay trẻ em, xa nguồn nước, thức ăn và động vật.
- * **Sơ cấp cứu:** Nếu bị dính hoặc bị bắn nhiều thuốc ngay lập tức cởi quần áo bị dính, rửa kỹ phần bị dính thuốc bằng nhiều nước. Trường hợp ngộ độc, cần đưa ngay nạn nhân đi cấp cứu, nhớ mang theo nhãn thuốc.

Xuất xứ: Malaysia
Đơn vị đăng ký & ủy quyền: Kenso Corporation (M) Sdn. Bhd.
Add: Lot 29, Jalan Sugai Pinang 5/4, Taman Perindustrian Pulau Indah, 42920 Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Nhân ủy quyền: Tập đoàn Delta Thủy Sĩ
Đơn vị sản xuất: Xem trên phiếu KCS

THẺ TÍCH THUỐC
900ml


SĐK: 7387/CNĐKT-BVTV
Hạn sử dụng: 02 năm kể từ NSX
NSX, ngày đóng gói: Xem trên bao bì
Số lô SX: Xem trên bao bì, vỏ kiện.

LẮC ĐỀU CHAI TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Kenbast 900ml - AgriShop - KT 297x122mm, gồm mép 10mm - LN

Ngày 18/03/2024


***Hoạt chất:** + Glufosinate ammonium 200g/ l
+ **Đóng NL lỏng – màu đỏ**



Gussi bastar 900ml - AgriShop - KT 297x122mm, gồm mép 10mm - LN

Ngày 18/03/2024

Ưu điểm, lợi thế cạnh tranh của dòng Glu Lông



```
graph LR; A[Ưu điểm, lợi thế cạnh tranh của dòng Glu Lông] --> B[Giá tốt nhất thị trường ( so với sản phẩm cùng độ đặc, cùng chất lượng).]; A --> C[Dung dịch có độ đặc không cao như Q7, Q10, Gussi... ( nhưng vẫn cao hơn các sản phẩm của các thương hiệu khác trên thị trường)]; A --> D[Hàng mới ( Ít bị đụng hàng)];
```

Giá tốt nhất thị trường (so với sản phẩm cùng độ đặc, cùng chất lượng).

Dung dịch có độ đặc không cao như Q7, Q10, Gussi... (nhưng vẫn cao hơn các sản phẩm của các thương hiệu khác trên thị trường)

Hàng mới (Ít bị đụng hàng)

PHÂN BIỆT MÀU NGUYÊN LIỆU

MÀU ĐỎ

MÀU TÍM

**BÒ RỪNG
(GLU 150SL
ĐẶC)**

**VOI RỪNG
(GLU 200SL
LONG)**

**PARATO THẦN
LỬA
(KENBAST
15SL GLOD
ĐẶC)**

**LẠC ĐÀ
(GLU 150SL
LONG)**

**SHINA 18SL
(GLU 200
ĐẶC)**

6. BINHTOX 3.8EC GOLD

- * **Hoạt chất:** Abamectin 38 g/l
(**chất phụ gia đặc biệt**)
- * **Công dụng:** **trừ sâu tơ**, sâu vẽ bùa, **sâu hành**, sâu xám, sâu keo, bọ nhậy..

THUỐC TRỪ SÂU

BINHTOX 3.8EC GOLD

Hoạt chất: Abamectin 38 g/L + Chất phụ gia 962 g/L

Chuyên trừ: SÂU TƠ, SÂU HÀNH, SÂU VẼ BÙA, BỌ NHẢY, SÂU XÁM, SÂU KEO...

AN TOÀN - HIỆU QUẢ - THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Thể tích: 30ml

NGUY HIỂM

Ngộ độc nếu nuốt, hít phải

Ngộ độc khi tiếp xúc với da

Sâu tơ, bọ nhậy, sâu ăn lá, vẽ bùa : Pha 25 ml/20L nước.

Sâu hành: Pha 50 - 100 ml/20L nước.

Số ĐK: 3362/CNĐKT- BVTV

Đăng ký và ủy quyền: Bailing Agrochemical Co., Ltd

Add: The 4th Bridge Jiangnan Road, Jiangnan District, Tai Zhou City, Jiangsu, China.

An toàn sử dụng: Thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn khi sử dụng thuốc.

Đơn vị: Xem trên phiếu KCS

Xuất xứ hàng hóa: China.

Thời gian cách ly: 7 ngày

HSD: 2 năm kể từ NSX *NSX, ngày đóng gói: Xem trên bao bì

Số lô SX: Xem trên bao bì, vỏ kiện.

Đơn vị phân phối: TẬP ĐOÀN DELTA THUY SĨ

ĐC: 41 Đường Số 6, Ấp 3, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. HCM

ĐT: 0901.496.213

"Đọc kỹ nhãn phụ kèm theo trước khi sử dụng"

LẮC ĐỀU CHAI TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

THUỐC TRỪ SÂU

BINHTOX 3.8EC

GOLD

Hoạt chất: Avermectin B1a, B1b (Abamectin): 38g/lit

Special additives: 962g/lit

HIỆU QUẢ SAU 24h

CHUYÊN TRỪ: SÂU TƠ, SÂU HÀNH, SÂU VẼ BÙA, BỌ NHẢY, SÂU XÁM, SÂU KEO...

LIÊN HỆ MUA HÀNG / TƯ VẤN KỸ THUẬT / ZALO:

0834.888.539 - 0919.410.292 - 02723.778.061

Kết quả thử nghiệm sâu tơ ngày 10.04 Cải xanh

STT	Công thức	Liều dùng/20L	Kết quả sau 3 ngày		Ghi chú	Ngộ độc	Ghi chú
			Tỉ lệ chết				
			Vườn 1	Vườn 2			
1	Binhtox 3.8EC Gold	15ml	85-90	85	Sâu chết tốt, Cải sạch, rất ít vết cắn mới Có xác sâu	Không ghi nhận ảnh hưởng	Sạch sâu, xót 4-5 con/1m2
2	Binhtox 3.8EC Gold	20ml	90-95	90-95	Sâu chết tốt, Cải sạch, rất ít vết cắn mới Có xác sâu	Không ghi nhận ảnh hưởng	Sạch sâu, xót 2-3 con/1m2
3	Binhtox 3.8EC Gold	25ml	95-100	95-100	Sâu chết tốt, Cải sạch, rất ít vết cắn mới Có xác sâu	Không ghi nhận ảnh hưởng	Gần như sạch sâu
4	Binhtox 3.8EC Gold	30ml	95-100	100	Sâu chết tốt, Cải sạch, rất ít vết cắn mới Có xác sâu	Không ghi nhận ảnh hưởng	Sạch sâu
	Mật độ sâu: 20-22 con/10 cây						
	Tuổi sâu: 1234						

sâu ít dùng 20-25ml/ 20L nước.
Sâu nhiều pha 30ml/ 20L nước chết sạch sẽ
Sâu hành: 50-100ml/ 20L

Cám ơn mọi người đã lắng nghe!
Chúc mọi người có một kết quả bán hàng thật tốt.