

CÁC LỖI HAY GÂY RA NHẦM LẤN

I. CÁC LỖI THƯỜNG XẢY RA

II. CÁCH PHÂN BIỆT NHẦM LẤN

III. MỘT SỐ LƯU Ý

CÁC LỖI HAY GÂY RA NHẦM LẪN

I. CÁC LỖI THƯỜNG XẢY RA

1. Nhầm giữa hàng BMC – Phúc Thịnh
2. Nhầm màu sắc
3. Nhầm giữa nước đục – nước trong
4. Nhầm giữa Ốc rải 15gr – 18gr
5. Nhầm giữa Ankamec – Haihamec – Chitin Daphamec
6. Nhầm giữa Hoanganhvil – Mekongvil
7. Nhầm giữa Kajio 1gr alpha – Kajio 1gr gold – Kajio 5wg
8. Nhầm giữa Bisomin 6wp – Bisomin 2sl
9. Nhầm giữa Ohayo xpro – ohayo 100sc – Kosho ohayo 240sc
10. Nhầm giữa Scortlan 80wp M45 giáo sư bệnh – Scortlan 80wp M45 trùn nấm bệnh.
11. Nhầm giữa Horisan 75 (delta) – Forsan 60ec

CÁC LỖI HAY GÂY RA NHẦM LẪN

Các loại sản phẩm có 2 màu: xanh + vàng

- Byphan
- An-k-zeb
- Niko
- Fortazeb
- Tatsu
- Scortlan

Các loại sản phẩm có 2 màu: trắng + xanh

- Yoshino
- Tatsu trắng

CÁC LỖI HAY GÂY RA NHẦM LẪN

Các sản phẩm có 2 dạng: nước đục – nước trong

- Ankmec
- Haihamec
- Chitin daphamec
- Daphamec 5.0

CÁC LỖI HAY GÂY RA NHẦM LẪN

Các sản phẩm có nhiều loại nhiều nhãn hiệu

- Kajio 1gr alpha
- Kajio 1gr gold
- Kajio 5WG
- Kajio 5EC
- Bisomin 6wp
- Bisomin 2sl
- Ohayo xpro
- ohayo 100sc
- Kosho ohayo 240sc
- Scortlan 80wp M45 giáo sư bệnh
- Scortlan 80wp M45 trùm nấm bệnh.
- Horisan 75 (delta)
- Forsan 60ec

CÁC LỖI HAY GÂY RA NHẦM LẤN

II. CÁCH PHÂN BIỆT NHẦM LẤN

1. Nhầm giữa hàng BMC – Phúc Thịnh:

Làm sao phân biệt?

CÁC LỖI HAY GÂY RA NHẦM LẤN

II. CÁCH PHÂN BIỆT NHẦM LẤN

1. Nhầm giữa hàng BMC – Phúc Thịnh:

- Nhãn giấy dán trên thùng



- Tên đơn vị phân phối (chỉ có 1 số nhãn dạng trực)





CÁC LỖI HAY GÂY RA NHẦM LẤN

II. CÁCH PHÂN BIỆT NHẦM LẤN

1. Nhầm giữa hàng BMC – Phúc Thịnh:

- Phân biệt qua nhãn hiệu



An-k-zeb 500g - Phúc Thịnh - 220x300mm
Ngày 22-07-2023

MỘT SỐ LƯU Ý		
1. Nhân phải cân mùng bèo	11. Đơn vị phân phối, địa chỉ	
2. Không nhân nhện con	12. Màu độc, biểu tượng độc	
3. Không nhân nhện con	13. Quy cách	
4. Không nhân nhện con	14. NSX, ngày đóng gói, HSD	
5. Không nhân nhện con	15. Liều lượng, cách dùng, HDATSD	
6. Không nhân nhện con	16. Thời gian cách ly	
7. Không nhân nhện con	17. Tên chất, kích thước	
8. Không nhân nhện con	18. Mã QR	
9. Không nhân nhện con	19. Cầu nhận biết	
10. Không nhân nhện con	20. Vị phạm số hữu trí tuệ	

An-k-zeb 100g - BMC - 170x220mm
Ngày 28/06/2023

MỘT SỐ LƯU Ý		
1. Nhân phải cân mùng bèo	11. Đơn vị phân phối, địa chỉ	
2. Không nhân nhện con	12. Màu độc, biểu tượng độc	
3. Không nhân nhện con	13. Quy cách	
4. Không nhân nhện con	14. NSX, ngày đóng gói, HSD	
5. Không nhân nhện con	15. Liều lượng, cách dùng, HDATSD	
6. Không nhân nhện con	16. Thời gian cách ly	
7. Không nhân nhện con	17. Tên chất, kích thước	
8. Không nhân nhện con	18. Mã QR	
9. Không nhân nhện con	19. Cầu nhận biết	
10. Không nhân nhện con	20. Vị phạm số hữu trí tuệ	

CÁC LỖI HAY GÂY RA NHẦM LẤN

II. CÁCH PHÂN BIỆT NHẦM LẤN

1. Nhầm giữa hàng BMC – Phúc Thịnh: - Phân biệt qua ký hiệu

THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC CAO CẤP

Ankamec 3.6EC
NƯỚC TRONG

Hoạt chất: Abamectin 3.6% w/w

Cảnh báo:
RẤT ĐỘC VỚI ỐC

SĐK: 5638/CNDKT-BVTV

Thế tích thực:
450ml

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Đặc điểm công dụng: Hoạt chất Abamectin là thuốc tiếp xúc, nội hấp lưu dẫn. Đặc trị Sâu cuốn lá/lúa.
Liều lượng: Lượng thuốc dùng: 20 - 50ml/ bình 20 - 25 lít. Lượng nước phun từ 400 - 500 lít/ha. Phun ướt đều lá cây trồng khi sâu non mới xuất hiện. Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun thuốc.
Hướng dẫn an toàn sử dụng:
- Bảo quản xa tầm tay trẻ em.
- Không hút thuốc, ăn hoặc uống trong khi sử dụng sản phẩm này.
- Khi tiếp xúc hoặc chuẩn bị thuốc tránh hít phải thuốc, để thuốc tiếp xúc với miệng, da và mắt, mang bảo hộ lao động phù hợp.
- Nếu bị dính thuốc ngay lập tức rửa kỹ mắt hoặc bị dính thuốc ở quần áo bị dính thuốc, rửa kỹ phần bị dính thuốc bằng nhiều nước.
- Sau khi sử dụng: rửa chân tay và tắm rửa, rửa sạch trang bị bảo hộ lao động.
- Giữ kín bao gói gốc được dán nhãn.
- Không sử dụng lại bao gói này vì bất kỳ mục đích nào khác.
- Để bao gói ở nơi an toàn, tránh xa thức ăn, trẻ em và động vật.
- Bỏ bao gói đã sử dụng đúng nơi quy định.
- Bao gói sau sử dụng phải được rửa 3 lần.
- Trường hợp ngộ độc, cần phải đưa ngay nạn nhân đi cấp cứu, nhớ mang theo nhãn thuốc.
Xuất xứ: China
Đơn vị ủy quyền: Topsen Biotech Co., Ltd
Add: Block B, Foodstuff, Dongmen South road, Shenzhen, China
Đơn vị đăng ký: Công ty TNHH Agricare Việt Nam
ĐC: Tầng 15, tòa nhà Lila 10, phố Tô Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
HSD: 2 năm kể từ NSX. NSX, ngày đóng gói: Xem trên bao bì (Số lô SX xem trên bao bì, vô kiện)
Sản xuất: Xem trên phiếu KCS ngoài vỏ thùng.
Phân phối và chịu trách nhiệm: Xem trên bao bì ngoài vỏ thùng

Ankamec 3.6 - 450ml BMC - 106x58mm, ngày 14/09/2023

TÊN THƯƠNG MẠI		MỘT SỐ LƯU Ý	
1. Tên thương mại	11. Đơn vị phân phối, địa chỉ	1. Nhận phải cân bằng bóng	
2. Hoạt chất - hàm lượng	12. Màu độc, biểu tượng độc	2. Không nhận nhãn con	
3. Số đăng ký	13. Quy cách	3. Để nhận không bị con: Để cuộn tối thiểu 12h trước khi cắt, cân bằng nhiệt độ thấp, không bình nhân kích thước nhỏ ở 4 góc...	
4. Số hợp quy	14. NSX, ngày đóng gói, HSD	4. Đối với các sản phẩm Bpatox, Biperin, Imamda, Bpnhphubn, Bpimol, Bpynon, Bpococ	
5. Đối tượng đăng ký	15. Liều lượng, cách dùng, HDATSD	5. Không để QR cho tất cả các nhân	
6. Đơn vị đăng ký, địa chỉ	16. Thời gian cách ly	6. Tất cả các nhân riêng của Khách hàng phía Bắc sẽ không để thông tin đơn vị phân phối và các thông tin trên giấy phép trừ đơn vị đăng ký, ủy quyền, sản xuất, xuất xứ và viết chữ nghiêng, khó nhìn.	
7. Tên chai, kích thước	17. Tên chai, kích thước		
8. Đơn vị sản xuất, địa chỉ	18. Mã QR		
9. Xuất xứ	19. Cầu nhận biết		
10. Mép trái	20. Vi phạm số hữu trí tuệ		

Ghi chú:

THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC
天大藥業 3.6EC

Hiệu Resqankamec 3.6EC
NƯỚC TRONG
Hoạt chất: Abamectin 3.6% w/w

Đặc trị: Nhện đỏ, nhện trắng, nhện vàng, sâu, rầy rệp, bọ trĩ chích hút trên cam, chè, phát thủ và các loại cây trồng.

Cảnh báo:
RẤT ĐỘC VỚI ỐC

SĐK: 5638/CNDKT-BVTV

Thế tích thực:
450ml

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Đặc điểm công dụng: Hoạt chất Abamectin là thuốc tiếp xúc, nội hấp lưu dẫn. Đặc trị Sâu cuốn lá/lúa.
Liều lượng: Lượng thuốc dùng: 20 - 50ml/ bình 20 - 25 lít. Lượng nước phun từ 400 - 500 lít/ha. Phun ướt đều lá cây trồng khi sâu non mới xuất hiện. Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun thuốc.
Hướng dẫn an toàn sử dụng:
- Bảo quản xa tầm tay trẻ em.
- Không hút thuốc, ăn hoặc uống trong khi sử dụng sản phẩm này.
- Khi tiếp xúc hoặc chuẩn bị thuốc tránh hít phải thuốc, để thuốc tiếp xúc với miệng, da và mắt, mang bảo hộ lao động phù hợp.
- Nếu bị dính thuốc ngay lập tức rửa kỹ mắt hoặc bị dính thuốc ở quần áo bị dính thuốc, rửa kỹ phần bị dính thuốc bằng nhiều nước.
- Sau khi sử dụng: rửa chân tay và tắm rửa, rửa sạch trang bị bảo hộ lao động.
- Giữ kín bao gói gốc được dán nhãn.
- Không sử dụng lại bao gói này vì bất kỳ mục đích nào khác.
- Để bao gói ở nơi an toàn, tránh xa thức ăn, trẻ em và động vật.
- Bỏ bao gói đã sử dụng đúng nơi quy định.
- Bao gói sau sử dụng phải được rửa 3 lần.
- Trường hợp ngộ độc, cần đưa ngay nạn nhân đi cấp cứu, nhớ mang theo nhãn thuốc.
Xuất xứ: China
Đơn vị ủy quyền: Topsen Biotech Co., Ltd
Add: Block B, Foodstuff, Dongmen South road, Shenzhen, China
Đơn vị đăng ký: Công ty TNHH Agricare Việt Nam
ĐC: Tầng 15, tòa nhà Lila 10, phố Tô Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
HSD: 2 năm kể từ NSX. NSX, ngày đóng gói: Xem trên bao bì (Số lô SX xem trên bao bì, vô kiện)
Sản xuất: Xem trên phiếu KCS ngoài vỏ thùng.
Phân phối và chịu trách nhiệm: Xem trên bao bì ngoài vỏ thùng

Ankamec 3.6 - 450ml Phúc Thịnh - 106x58mm

TÊN THƯƠNG MẠI		MỘT SỐ LƯU Ý	
1. Tên thương mại	11. Đơn vị phân phối, địa chỉ	1. Nhận phải cân bằng bóng	
2. Hoạt chất - hàm lượng	12. Màu độc, biểu tượng độc	2. Không nhận nhãn con	
3. Số đăng ký	13. Quy cách	3. Để nhận không bị con: Để cuộn tối thiểu 12h trước khi cắt, cân bằng nhiệt độ thấp, không bình nhân kích thước nhỏ ở 4 góc...	
4. Số hợp quy	14. NSX, ngày đóng gói, HSD	4. Đối với các sản phẩm Bpatox, Biperin, Imamda, Bpnhphubn, Bpimol, Bpynon, Bpococ	
5. Đối tượng đăng ký	15. Liều lượng, cách dùng, HDATSD	5. Không để QR cho tất cả các nhân	
6. Đơn vị đăng ký, địa chỉ	16. Thời gian cách ly	6. Tất cả các nhân riêng của Khách hàng phía Bắc sẽ không để thông tin đơn vị phân phối và các thông tin trên giấy phép trừ đơn vị đăng ký, ủy quyền, sản xuất, xuất xứ và viết chữ nghiêng, khó nhìn.	
7. Tên chai, kích thước	17. Tên chai, kích thước		
8. Đơn vị sản xuất, địa chỉ	18. Mã QR		
9. Xuất xứ	19. Cầu nhận biết		
10. Mép trái	20. Vi phạm số hữu trí tuệ		

Ghi chú:

Ngày 28/03/2023



Nguy hiểm
Ngộ độc nếu nuốt phải
Ngộ độc nếu hít phải
Ngộ độc khi tiếp xúc với da

THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC CAO CẤP

Ankamec 3.6EC

NƯỚC TRONG

Hoạt chất: Abamectin 3.6% w/w



Cảnh báo:

RẤT ĐỘC VỚI ỐC



SĐK: 5638/CNĐKT-BVTV

Thể tích thực:
450ml



Ankamec 3.6 - 450ml BMC - 106x58mm, ngày 14/09/2023

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Đặc điểm công dụng:

Hoạt chất Abamectin là thuốc tiếp xúc, nội hấp lưu dẫn.

Đặc trị Sâu cuốn lá/lúa.

Liều lượng:

Lượng thuốc dùng: 20 - 50ml/ bình 20 - 25 lít

Lượng nước phun từ 400 - 500 lít/ha.

Phun ướt đều lá cây trồng khi sâu non mới xuất hiện.

Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun thuốc.

Hướng dẫn an toàn sử dụng:

- Bảo quản xa tầm tay trẻ em.
- Không hút thuốc, ăn hoặc uống trong khi sử dụng sản phẩm này.
- Khi tiếp xúc hoặc chuẩn bị thuốc: tránh hít phải thuốc, để thuốc tiếp xúc với miệng, da và mắt, mang bảo hộ lao động phù hợp.
- Nếu bị dính thuốc ngay lập tức cởi quần áo bị dính hoặc bị bắn nhiều thuốc, rửa kỹ phần bị dính thuốc bằng nhiều nước.
- Sau khi sử dụng: rửa chân tay và tắm rửa, rửa sạch trang bị bảo hộ lao động.
- Giữ kín bao gói gốc được dán nhãn.
- Không sử dụng lại bao gói này vì bất kỳ mục đích nào khác.
- Để bao gói ở nơi an toàn, tránh xa thức ăn, trẻ em và động vật.
- Bỏ bao gói đã sử dụng đúng nơi quy định.
- Bao gói sau sử dụng phải được rửa 3 lần.
- Trường hợp ngộ độc, cần phải đưa ngay nạn nhân đi cấp cứu, nhớ mang theo nhãn thuốc.

Xuất xứ: China

Đơn vị ủy quyền: Topsen Biotech Co., Ltd

Add: Block B, Foodstuff, Dongmen South road, Shenzhen, China

Đơn vị đăng ký: Công ty TNHH Agricare Việt Nam

ĐC: Tầng 15, tòa nhà Lilama 10, phố Tố Hữu, P. Trung Văn,

Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

HSD: 2 năm kể từ NSX *NSX, ngày đóng gói: Xem trên bao bì
(Số lô SX xem trên bao bì, vỏ kiện)

Sản xuất: Xem trên phiếu KCS ngoài vỏ thùng.

Phân phối và chịu trách nhiệm:

Xem trên bao bì ngoài vỏ thùng



6364/SNN-TTBT/VOLCL

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

CÁC LỖI HAY GÂY RA NHẦM LẤN

II. CÁCH PHÂN BIỆT NHẦM LẤN

2. Nhầm màu sắc

Làm sao phân biệt?

CÁC LỖI HAY GÂY RA NHẦM LẤN

II. CÁCH PHÂN BIỆT NHẦM LẤN

2. Nhầm màu sắc

- Nhãn giấy trên thùng




Loại chai:	1KG
Quy cách đóng chai:	20 GÓI/THÙNG
Nguyên liệu - Màu sắc:	AN-K-ZEB 800WP- MÀU XANH
Số lô sx	LSX:12.10.23
Tên Khách Hàng:	TỶ PHÚC THỊNH

CÁC LỖI HAY GÂY RA NHẦM LẤN


II. CÁCH PHÂN BIỆT NHẦM LẤN

2. Nhầm màu sắc

- Dấu tick trên gói



An-k-zeb 500g - Phúc Thịnh - 220x300mm
Ngày 22-07-2023



MỘT SỐ LƯU Ý		
1. Tên thương mại	11. Đơn vị phân phối, địa chỉ	1. Nhận phải cân bằng
2. Hoạt chất - hàm lượng	12. Màu sắc, biểu tượng độc	2. Không nhận nhầm con.
3. Số đăng ký	13. Quy cách	- Để nhận không bị con: Để cuộn tối thiểu 12h trước khi cắt, cuộn mang nhiệt độ thấp, không bình nhám kích thước nhỏ 4 góc...
4. Số hợp quy	14. NSX, ngày đóng gói, HSD	3. Quy định canh tác:
5. Đối tượng đăng ký	15. Liều lượng, cách dùng, HDATSD	- Mép trái: Các nhân Jiafosina quy cách từ 450ml -> 1000ml
6. Đơn vị đăng ký, địa chỉ	16. Thời gian cách ly	- Mép phải: Tất cả các loại con lại.
7. Đơn vị ủy quyền, địa chỉ	17. Tên chai, kích thước	4. Đối với các sản phẩm Bipinex, Bipinex, Immanad, Bpinhepbun, Bipimal, Byphep, Bpsaco:
8. Đơn vị sản xuất, địa chỉ	18. Mã QR	- Không để QR cho tất cả các nhân.
9. Xuất xứ	19. Cầu nhận biết	- Tất cả các nhân rằng của Khách hàng phải được kiểm tra để thông tin đơn vị phân phối và các thông tin trên giấy phép như: đơn vị đăng ký, ủy quyền, sản xuất, xuất xứ sẽ viết chữ nghiêng, khó nhìn.
10. Mép trái	20. Vi phạm số hữu trí tuệ	

Ghi chú:

CÁC LỖI HAY GÂY RA NHẦM LẤN

II. CÁCH PHÂN BIỆT NHẦM LẤN

2. Nhầm màu sắc

- Dấu tick trên nhãn dán thùng



CÁC LỖI HAY GÂY RA NHẦM LẤN

II. CÁCH PHÂN BIỆT NHẦM LẤN

1. Nhầm giữa nước đục – nước trong:

Làm sao phân biệt?

CÁC LỖI HAY GÂY RA NHẦM LẤN

II. CÁCH PHÂN BIỆT NHẦM LẤN

1. Nhầm giữa nước đục – nước trong:

- Nhãn giấy dán thùng

Loại chai:	PET VUÔNG VÀNG-NÁP ĐỎ 450-04 HAITA
Quy cách đóng chai:	450ML X 40 CHAI / THÙNG
Nguyên liệu - Màu sắc:	ANKAMEC 3.6EC - NƯỚC ĐỤC (NƯỚC ĐỎ) LIỆU NHẬP KHẨU
Số lô sx	LSX: 22.02.24
Tên Khách Hàng:	BMC

Loại chai:	CHAI VUÔNG VÀNG-NÁP ĐỎ 450-04 HAITA
Quy cách đóng chai:	450ML X 40 CHAI / THÙNG
Nguyên liệu - Màu sắc:	ANKAMEC 3.6EC - NƯỚC TRONG
Số lô sx	LSX:26.02.24
Tên Khách Hàng:	BMC

CÁC LỖI HAY GÂY RA NHẦM LẤN

II. CÁCH PHÂN BIỆT NHẦM LẤN

1. Nhầm giữa nước đục – nước trong:

- Nhãn chai/thùng

THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC
ΑΠΚΑΜΕΚ 3.6EC

Nguy hiểm
Ngộ độc nếu nuốt phải
Ngộ độc nếu hít phải
Ngộ độc khi tiếp xúc với da

Hiệu Resqankamec 3.6EC
NƯỚC ĐỎ
Hoạt chất: Abamectin 3.6% w/w



Đặc trị: Nhện đỏ, nhện trắng, nhện vàng, sâu, rầy rệp, bọ trĩ chích hút trên cam, chè, phát thủ và các loại cây trồng.

Cảnh báo:
RẤT ĐỘC VỚI ỚC
SDK: 5638/CNĐKT-BVTV

Thế tích thực: **450ml**

9297-SIN-TRUYTUCL

Ankamec 3.6 - 450ml Phúc Thịnh - 106x58mm

MỘT SỐ LƯU Ý		
1. Tên thương mại	Đơn vị phân phối, địa chỉ	1. Nhãn phải cân bằng bằng
2. Hoạt chất - hàm lượng	Màu sắc, biểu tượng độc	2. Không nhận nhãn công
3. Số đăng ký	Quy cách	3. Để nhận không bị cong: Để cuộn tối thiểu 12h trước khi cắt, cán mang ở nhiệt độ thấp, không bình hành kích thước nhỏ ở 4 góc...
4. Số hợp quy	NSX, ngày đóng gói, HSD	4. Quy định cảnh mìn:
5. Đối tượng đăng ký	Liều lượng, cách dùng, HDATSD	- Mẹp trái: Tất cả các loại côn trùng
6. Đơn vị đăng ký, địa chỉ	Thời gian cách ly	- Mẹp trái: Tất cả các loại côn trùng
7. Đơn vị ủy quyền, địa chỉ	Tên chai, kích thước	- Mẹp trái: Tất cả các loại côn trùng
8. Đơn vị sản xuất, địa chỉ	Mã QR	- Không để QR cho tất cả các nhân
9. Xuất xứ	Cầu nhận biết	- Tất cả các nhân riêng của khách hàng phải để: sẽ không để thông tin đơn vị phân phối và các thông tin trên giấy phép như: đơn vị đăng ký, ủy quyền, sản xuất, xuất xứ sẽ viết chữ nghiêng, khó nhìn.
10. Mẹp trái	Mẹp phải	

Ghi chú:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Đặc điểm công dụng:
Hoạt chất Abamectin là thuốc tiếp xúc, nội hấp lưu dẫn.
Đặc trị: Sâu cuốn lá/lúa

Liều lượng:
Lượng thuốc dùng: 20 - 50ml/ bình 20 - 25 lít
Lượng nước phun từ 400 - 500 lít/ha.
Phun ướt đều lá cây trồng khi sâu non mới xuất hiện.
Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun thuốc.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN SỬ DỤNG:
An toàn sử dụng: Không hút thuốc, ăn hoặc uống trong khi sử dụng sản phẩm này. Khi tiếp xúc hoặc chuẩn bị thuốc: Tránh hít phải thuốc, tránh để thuốc tiếp xúc với miệng, da và mắt, mang bảo hộ lao động phù hợp. Sau khi sử dụng: Rửa chân tay và tắm rửa, rửa sạch trang bị bảo hộ lao động. Giữ kín bao gói gốc được dán nhãn. Không sử dụng lại bao gói này vì bất kỳ mục đích nào khác. Để bao gói ở nơi an toàn, tránh xa thức ăn, trẻ em và động vật. Bỏ bao gói đã sử dụng đúng nơi quy định. Bao gói sau sử dụng phải được rửa lại 3 lần.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, xa tầm tay trẻ em, xa nguồn nước, thức ăn và động vật.

Sơ cấp cứu: Nếu bị dính hoặc bị bắn nhiều thuốc ngay lập tức cởi quần áo bị dính, rửa kỹ phần bị dính thuốc bằng nhiều nước. Trường hợp ngộ độc, cần đưa ngay nạn nhân đi cấp cứu, nhớ mang theo nhãn thuốc.

Xuất xứ: China
Đơn vị ủy quyền: Topsis Biotech Co., Ltd
Add: Block B, Foodstuff, Dongmen South road, Shenzhen, China
Đơn vị đăng ký: Công ty TNHH Agricare Việt Nam
ĐC: Tầng 15, tòa nhà Lilama 10, phố Tô Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Đơn vị sản xuất: Xem trên phiếu KCS
HSD: 2 năm kể từ NSX
NSX, ngày đóng gói: Xem trên bao bì
(Số lô SX xem trên bao bì, vỏ kiện)

Phân phối & chịu trách nhiệm:
Xem trên phiếu KCS

ĐỘC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Ngày 02/11/2023

THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC
ΑΠΚΑΜΕΚ 3.6EC

Nguy hiểm
Ngộ độc nếu nuốt phải
Ngộ độc nếu hít phải
Ngộ độc khi tiếp xúc với da

Hiệu Resqankamec 3.6EC
NƯỚC TRONG
Hoạt chất: Abamectin 3.6% w/w



Đặc trị: Nhện đỏ, nhện trắng, nhện vàng, sâu, rầy rệp, bọ trĩ chích hút trên cam, chè, phát thủ và các loại cây trồng.

Cảnh báo:
RẤT ĐỘC VỚI ỚC
SDK: 5638/CNĐKT-BVTV

Thế tích thực: **450ml**

9297-SIN-TRUYTUCL

Ankamec 3.6 - 450ml Phúc Thịnh - 106x58mm

MỘT SỐ LƯU Ý		
1. Tên thương mại	Đơn vị phân phối, địa chỉ	1. Nhãn phải cân bằng bằng
2. Hoạt chất - hàm lượng	Màu sắc, biểu tượng độc	2. Không nhận nhãn công
3. Số đăng ký	Quy cách	3. Để nhận không bị cong: Để cuộn tối thiểu 12h trước khi cắt, cán mang ở nhiệt độ thấp, không bình hành kích thước nhỏ ở 4 góc...
4. Số hợp quy	NSX, ngày đóng gói, HSD	4. Quy định cảnh mìn:
5. Đối tượng đăng ký	Liều lượng, cách dùng, HDATSD	- Mẹp trái: Tất cả các loại côn trùng
6. Đơn vị đăng ký, địa chỉ	Thời gian cách ly	- Mẹp trái: Tất cả các loại côn trùng
7. Đơn vị ủy quyền, địa chỉ	Tên chai, kích thước	- Mẹp trái: Tất cả các loại côn trùng
8. Đơn vị sản xuất, địa chỉ	Mã QR	- Không để QR cho tất cả các nhân
9. Xuất xứ	Cầu nhận biết	- Tất cả các nhân riêng của khách hàng phải để: sẽ không để thông tin đơn vị phân phối và các thông tin trên giấy phép như: đơn vị đăng ký, ủy quyền, sản xuất, xuất xứ sẽ viết chữ nghiêng, khó nhìn.
10. Mẹp trái	Mẹp phải	

Ghi chú:

Ngày 28/03/2023

CÁC LỖI HAY GÂY RA NHẦM LẤN

II. CÁCH PHÂN BIỆT NHẦM LẤN

1. Nhầm giữa Ốc rải 15gr – 18gr
2. Nhầm giữa Ankamec – Haihamec – Chitin Daphamec
3. Nhầm giữa Hoanganhvil – Mekongvil
4. Nhầm giữa Kajio 1gr alpha – Kajio 1gr gold – Kajio 5wg
5. Nhầm giữa Bisomin 6wp – Bisomin 2sl – Kasugasin 3sl
6. Nhầm giữa Ohayo xpro – ohayo 100sc – Kosho ohayo 240sc
7. Nhầm giữa Scortlan 80wp M45 giáo sư bệnh – Scortlan 80wp M45 trùn nấm bệnh.
8. Nhầm giữa Horisan 75 (delta) – Forsan 60ec

Tương tự như trên

THUỐC TRỪ SÂU

KAJIO 1GR ALPHA

Hoạt chất: Avermectin B1a 90% + Avermectin B1b 10% (Cả hai đều là chất trừ sâu sinh học được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp. Thuốc có nguồn gốc từ vi sinh vật, phổ tác dụng rộng, diệt được rất nhiều côn trùng miệng nhai và chích hút...)

TIẾP XÚC - VỊ ĐỘC - XÔNG HƠI - LƯU DẪN TỪ GỐC TỚI NGỌN

ANH HÙNG SÙNG®

THUỐC RÀI GỐC - DIỆT SẠCH SÂU - TỪ GỐC TỚI NGỌN

Kajio 1GR - 100g Delta Thủy Sĩ - KT 170x220mm - LN

THUỐC TRỪ SÂU

KAJIO 5.0WG

Hoạt chất: Emamectin Benzoate 50g/kg
SDK: 3156/CNDKT-BVTV

SIÊU SẠCH SÂU

Khối lượng: 15gr

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

KAJIO ALPHA chứa hoạt chất **Emamectin Benzoate** là chất trừ sâu sinh học được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp. Thuốc có nguồn gốc từ vi sinh vật, phổ tác dụng rộng, diệt được rất nhiều côn trùng miệng nhai và chích hút...)

Sản phẩm được đăng ký từ bộ hã khoai lang, tuyến trùng hô tiêu, bộ hung/máu, sâu đục thân/lúa...

Cây trồng	Sinh vật hại	Liều lượng	Cách sử dụng
Lúa, mía, ngô, khoai lang, khoai môn, khoai tây, hành, lạc, cà phê, hồ tiêu, rau ăn lá, hoa lily, hoa cúc, hoa hồng, cam, cà chua, cà chua, cà rốt, thanh long, sầu riêng, xoài...	Tuyến trùng hô tiêu, sâu đục thân/sâu cuốn lá, sâu khoai, sùng đất, ve sầu, sâu nhện, sâu đục, sâu xám, bọ trĩ (bò lạch), bọ nhày, muỗi hành (sâu nhện)...	Lượng thuốc dùng: Từ 10 - 20 kg/ha (10.000m²). Cách dùng: Rải gốc khi sâu mới chớm xuất hiện. Lưu ý: Có thể tăng liều khi sâu, sùng nhiều.	

Thời gian cách ly: 7 ngày.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN SỬ DỤNG

An toàn sử dụng: Không hít thuốc, ăn hoặc uống trong khi sử dụng sản phẩm này. Khi tiếp xúc hoặc chuẩn bị thuốc: Tránh hít phải thuốc, tránh để thuốc tiếp xúc với miệng, da và mắt, mang bảo hộ lao động phù hợp. Sau khi sử dụng: Rửa sạch tay và tắm rửa, rửa sạch trang bị bảo hộ lao động. Giữ kín bao gói gốc được dán nhãn. Không sử dụng lại bao gói này vì bất kỳ mục đích nào khác. Để bao gói ở nơi an toàn, tránh xa thức ăn, trẻ em và động vật. Bỏ bao gói đã sử dụng đúng nơi quy định. Bao gói sau sử dụng phải được rửa lại 3 lần.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, xa tầm tay trẻ em, xa nguồn nước, thức ăn và động vật.

Sử dụng: Nếu bị dính hoặc bị bắn nhiều thuốc, ngay lập tức cởi quần áo bị dính, rửa kỹ phần bị dính thuốc bằng nhiều nước. Trường hợp ngộ độc, cần đưa ngay nạn nhân đi cấp cứu, nhớ mang theo nhãn thuốc.

Xuất xứ Singapore
Số đăng ký: SDA/CNDKT-BVTV
Đơn vị ủy quyền: Ace Bioscience Pte Ltd.
Địa chỉ: 1, Marymount Terrace, # 13-05, Singapore 570361.
Đơn vị đăng ký: Công ty CP B&C Việt Nam
Địa chỉ: Khu KT&H Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
HSD: 2 năm kể từ ngày xuất.
NSX: ngày đăng ký: Xem trên bao bì
SDS: Xem trên bao bì, và kèm

Hợp tác và phân phối: **TẬP ĐOÀN DELTA THỦY SĨ**
ĐC: 41 Đường Số 6, Ấp 3, Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh, TP. HCM
ĐT: 0901.496.213

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Ngày 06/12/2023

THUỐC TRỪ SÂU

KAJIO 1GR GOLD

Trùng Sùng®

Hoạt chất: Avermectin B1a 90% + Avermectin B1b 10% (Cả hai đều là chất trừ sâu sinh học được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp. Thuốc có nguồn gốc từ vi sinh vật, phổ tác dụng rộng, diệt được rất nhiều côn trùng miệng nhai và chích hút...)

TIẾP XÚC - VỊ ĐỘC - XÔNG HƠI - LƯU DẪN TỪ GỐC TỚI NGỌN

THUỐC RÀI VÀO GỐC
DIỆT SÂU, SÙNG - TỪ GỐC TỚI NGỌN
ĐANG CẬP HẸNG HẸNG

Thời gian cách ly: 7 ngày

HƯỚNG DẪN AN TOÀN SỬ DỤNG

An toàn sử dụng: Không hít thuốc, ăn hoặc uống trong khi sử dụng sản phẩm này. Khi tiếp xúc hoặc chuẩn bị thuốc: Tránh hít phải thuốc, tránh để thuốc tiếp xúc với miệng, da và mắt, mang bảo hộ lao động phù hợp. Sau khi sử dụng: Rửa sạch tay và tắm rửa, rửa sạch trang bị bảo hộ lao động. Giữ kín bao gói gốc được dán nhãn. Không sử dụng lại bao gói này vì bất kỳ mục đích nào khác. Để bao gói ở nơi an toàn, tránh xa thức ăn, trẻ em và động vật. Bỏ bao gói đã sử dụng đúng nơi quy định. Bao gói sau sử dụng phải được rửa lại 3 lần.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, xa tầm tay trẻ em, xa nguồn nước, thức ăn và động vật.

Sử dụng: Nếu bị dính hoặc bị bắn nhiều thuốc, ngay lập tức cởi quần áo bị dính, rửa kỹ phần bị dính thuốc bằng nhiều nước. Trường hợp ngộ độc, cần đưa ngay nạn nhân đi cấp cứu, nhớ mang theo nhãn thuốc.

Xuất xứ Singapore
Số đăng ký: SDA/CNDKT-BVTV
Đơn vị ủy quyền: Ace Bioscience Pte Ltd.
Địa chỉ: 1, Marymount Terrace, # 13-05, Singapore 570361.
Đơn vị đăng ký: Công ty CP B&C Việt Nam
Địa chỉ: Khu KT&H Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
HSD: 2 năm kể từ ngày xuất.
NSX: ngày đăng ký: Xem trên bao bì
SDS: Xem trên bao bì, và kèm

Hợp tác và phân phối: **TẬP ĐOÀN DELTA THỦY SĨ**
ĐC: 41 Đường Số 6, Ấp 3, Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh, TP. HCM
ĐT: 0901.496.213

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Kajio 1GR GOLD - 1kg Delta Thủy Sĩ - KT 250x350mm - LN

Ngày 07/12/2023

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây trồng	Sinh vật hại	Liều lượng	Cách dùng
Bắp cải, cà chua, lạc, hành, dưa hấu, dưa chuột, ớt	Sâu ăn, sâu xanh, sâu khoang, rệp muội, sâu xanh da lằng	120-200 g/ha	Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2.

Pha 1g/0,1 bình 20 - 25 lít nước phun ướt đều Phun 2 bình/1000 m², phun ướt đều tán cây trồng

Thời gian cách ly: 7 ngày

HƯỚNG DẪN AN TOÀN SỬ DỤNG

Bảo quản: Xa tầm tay trẻ em.

Không hít thuốc, ăn hoặc uống trong khi sử dụng sản phẩm này.

Khi tiếp xúc hoặc chuẩn bị thuốc: Tránh hít phải thuốc, để thuốc tiếp xúc với miệng, da và mắt, mang bảo hộ lao động phù hợp.

Sau khi sử dụng: Rửa sạch tay và tắm rửa, rửa sạch trang bị bảo hộ lao động.

Giữ kín bao gói gốc được dán nhãn.

Bao gói sau sử dụng phải được rửa 3 lần.

Bỏ bao gói đã sử dụng đúng nơi quy định.

Không sử dụng lại bao gói này vì bất kỳ mục đích nào khác.

Để bao gói ở nơi an toàn, tránh xa thức ăn, trẻ em và động vật.

Nếu bị dính thuốc, ngay lập tức cởi quần áo bị dính hoặc bị bắn nhiều thuốc, rửa kỹ phần bị dính thuốc bằng nhiều nước.

Trường hợp ngộ độc, cần đưa ngay nạn nhân đi cấp cứu, nhớ mang theo nhãn thuốc.

Xuất xứ Singapore
Số đăng ký: SDA/CNDKT-BVTV
Đơn vị ủy quyền: Ace Bioscience Pte Ltd.
Địa chỉ: 1, Marymount Terrace, # 13-05, Singapore 570361.
Đơn vị đăng ký: Công ty CP B&C Việt Nam
Địa chỉ: Khu KT&H Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
HSD: 2 năm kể từ ngày xuất.
NSX: ngày đăng ký: Xem trên bao bì
SDS: Xem trên bao bì, và kèm

Sản xuất: Xem trên nhãn KCS ngoài vỏ thùng

Phân phối và chịu trách nhiệm: Xem trên bao bì ngoài vỏ thùng

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC CAO CẤP

KAJIO 5.0EC

Siêu Nhanh - Siêu Tốt

Hoạt chất: Emamectin benzoate 50g/l

Công nghệ sản xuất Nhật Bản

Sản phẩm của Singapore

SDK: 3155/CNDKT-BVTV

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

KAJIO GOLD chứa hoạt chất **Avermectin B1a 90% + Avermectin B1b 10%** (Cả hai đều là chất trừ sâu sinh học được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp. Thuốc có nguồn gốc từ vi sinh vật, phổ tác dụng rộng, diệt được rất nhiều côn trùng miệng nhai và chích hút...)

Sản phẩm được đăng ký từ bộ hã khoai lang, tuyến trùng hô tiêu, bộ hung/máu, sâu đục thân/lúa...

Cây trồng	Sinh vật hại	Liều lượng	Cách sử dụng
Lúa, mía, ngô, khoai lang, khoai môn, khoai tây, hành, lạc, cà phê, hồ tiêu, rau ăn lá, hoa lily, hoa cúc, hoa hồng, cam, cà chua, cà chua, cà rốt, thanh long, sầu riêng, xoài...	Tuyến trùng hô tiêu, sâu đục thân/sâu cuốn lá, sâu khoai, sùng đất, ve sầu, sâu nhện, sâu đục, sâu xám, bọ trĩ (bò lạch), bọ nhày, muỗi hành (sâu nhện)...	Lượng thuốc dùng: Từ 10 - 20 kg/ha (10.000m²). Cách dùng: Rải gốc khi sâu mới chớm xuất hiện. Lưu ý: Có thể tăng liều khi sâu, sùng nhiều.	

Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi sử dụng

HƯỚNG DẪN AN TOÀN SỬ DỤNG

An toàn sử dụng: Không hít thuốc, ăn hoặc uống trong khi sử dụng sản phẩm này. Khi tiếp xúc hoặc chuẩn bị thuốc: Tránh hít phải thuốc, tránh để thuốc tiếp xúc với miệng, da và mắt, mang bảo hộ lao động phù hợp. Sau khi sử dụng: Rửa sạch tay và tắm rửa, rửa sạch trang bị bảo hộ lao động. Giữ kín bao gói gốc được dán nhãn. Không sử dụng lại bao gói này vì bất kỳ mục đích nào khác. Để bao gói ở nơi an toàn, tránh xa thức ăn, trẻ em và động vật. Bỏ bao gói đã sử dụng đúng nơi quy định. Bao gói sau sử dụng phải được rửa lại 3 lần.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, xa tầm tay trẻ em, xa nguồn nước, thức ăn và động vật.

Sử dụng: Nếu bị dính hoặc bị bắn nhiều thuốc, ngay lập tức cởi quần áo bị dính, rửa kỹ phần bị dính thuốc bằng nhiều nước. Trường hợp ngộ độc, cần đưa ngay nạn nhân đi cấp cứu, nhớ mang theo nhãn thuốc.

Xuất xứ Singapore
Số đăng ký: SDA/CNDKT-BVTV
Đơn vị ủy quyền: Ace Bioscience Pte Ltd.
Địa chỉ: 1, Marymount Terrace, # 13-05, Singapore 570361.
Đơn vị đăng ký: Công ty CP B&C Việt Nam
Địa chỉ: Khu KT&H Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
HSD: 2 năm kể từ ngày xuất.
NSX: ngày đăng ký: Xem trên bao bì
SDS: Xem trên bao bì, và kèm

Hợp tác và phân phối: **TẬP ĐOÀN DELTA THỦY SĨ**
ĐC: 41 Đường Số 6, Ấp 3, Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh, TP. HCM
ĐT: 0901.496.213

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN AN TOÀN SỬ DỤNG

An toàn sử dụng: Không hít thuốc, ăn hoặc uống trong khi sử dụng sản phẩm này. Khi tiếp xúc hoặc chuẩn bị thuốc: Tránh hít phải thuốc, tránh để thuốc tiếp xúc với miệng, da; Rửa sạch tay và mắt rửa, rửa sạch trang bị bảo hộ khi dùng. Giữ kín bao gói gốc được dán nhãn. Không sử dụng lại bao gói này bất kỳ mục đích nào khác. Để bao gói ở nơi an toàn, tránh xa thuốc ăn, trẻ em và động vật. Bảo gói đã sử dụng đúng nơi quy định. Giữ gói sau sử dụng phải được rửa lại 3 lần.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, xa tầm tay trẻ em, xa nguồn nước, thuốc ăn và động vật.

Sơ cấp cứu: Nếu bị dính thuốc bị bắn nhiều thuốc ngay lập tức cởi quần áo bị dính, rửa kỹ phần bị dính thuốc bằng nhiều nước. Trường hợp ngộ độc, cần đưa ngay nạn nhân đi cấp cứu, nhờ mang theo nhãn thuốc.

Đơn vị đăng ký: Công ty CP BNC Vĩnh Phúc
ĐC: Cụm KTXH, Xã Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
Đơn vị sản xuất: Xem trên phiếu KCS.

HSD: 2 năm kể từ NSK
NSK, ngày đóng gói; Xem trên bao bì
Số 10 SK: Xem trên bao bì, vỏ kiện.

Nhãn hiệu, hình ảnh "Sử dụng các sản phẩm" đi được đăng ký SHTT.
Không sao chép dưới mọi hình thức.

Thết tích thực

OHAYO 100SC

240ml

THUỐC TRỪ SÂU

CẢNH BÁO

Có thể có hại nếu nuốt, hít phải
Có thể có hại khi tiếp xúc với da

Thành phần:

Chlorfenapyr.....100g/L

Phụ gia đặc biệt.....900g/L

Đến từ
Delta Thủy Sĩ

SẮM SÉT

SẠCH SÂU

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Công dụng:

- **Ohayo_Xpro** diệt trừ được nhiều loại sâu, nhện, bọ trĩ, sâu xanh, sâu róm, sâu keo, bọ phấn, rầy xanh trên rau màu, lúa bắp, sầu riêng.....
- **Liều dùng:** 0,7 lít/ha.
- **Lượng nước phun:** Từ 400 - 500 lít/ha.
- **Cách pha:** Pha từ 20 - 30ml / bình 20 lít nước, phun ướt đều cây trồng.
- **Lưu ý:** Thời gian cách ly 14 ngày.
- **Phun thuốc** khi sâu còn nhỏ (ngòi 1 - 2).
- Không phun cho hoa hồng khi cây đang có hoa.

Tích hợp công nghệ xịt Drone

OR

Xuất xứ: Singapore.
Số DK: 4626/CNDK-BVTY

Đơn vị ủy quyền: Fertagro Pte. Ltd.
Add: 30, Toh Guan Road, #07-06, ODC Districentre, Singapore 608640.

Hợp tác và phân phối:

TẬP ĐOÀN DELTA THỦY SĨ
ĐC: 41 Đường Số 6, Ấp 3, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. HCM
ĐT: 0901.496.213

LẮC ĐỀU CHAI THUỐC KHI SỬ DỤNG

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Ngày 06/12/2023

Hướng dẫn an toàn sử dụng:

- Bảo quản xa tầm tay trẻ em.
- Không hút thuốc, ăn hoặc uống trong khi sử dụng sản phẩm này.
- Khi tiếp xúc hoặc chuẩn bị thuốc tránh hít phải thuốc, để thuốc tiếp xúc với miệng, da và mắt, mang bảo hộ lao động phù hợp.
- Nếu bị dính thuốc, ngay lập tức rửa sạch với xà phòng và nước nhiều thuốc, rửa kỹ nhiều lần dính thuốc bằng nhiều nước.
- Sau khi sử dụng rửa chân tay và tắm rửa, rửa sạch trang bị bảo hộ lao động.
- Giữ kín bao gói gốc được dán nhãn.
- Không sử dụng lại bao gói này vì bất kỳ mục đích nào khác.
- Để bao gói ở nơi an toàn, tránh xa thuốc lá, trẻ em, động vật hoang dã.
- Bỏ bao gói sau sử dụng đúng theo quy định.
- Bao gói sau sử dụng phải được rửa 3 lần.
- Trường hợp ngộ độc, cần đưa ngay nạn nhân đi cấp cứu, không mang theo nhãn thuốc.

CẢNH BÁO

Có thể có hại nếu nuốt phải

Có thể có hại nếu hít phải

Có thể có hại khi tiếp xúc với da

THUỐC TRỪ SÂU

Chayot 100SC

Thành phần

Chlorfenapyr 100g/l

Phụ gia đặc biệt 900g/l

Thể tích thực: 240ml

Tích hợp công nghệ xịt Drone

Công dụng:

Chayot 100SC được đăng ký trên sân xanh da láng trên cỏ sân xanh.

Hướng dẫn sử dụng:

- Liều dùng: 0,7 lít/ha. Lượng nước 400-500 lít/ha.
- Pha khoảng 25ml thuốc bình 16 lít, phun ướt đều cây.

Lưu ý:

- Phun thuốc khi sâu còn nhỏ (trước 2-)

Thời gian cách ly: 14 ngày sau khi phun

- Không phun cho hoa đang nở hoặc đang có hoa

Xuất xứ: Singapore

Hạn sử dụng: 2 năm kể từ NSX

NSX, ngày đóng gói, hạn tem bảo vệ

(Số ít SX xem trên bao bì và nhãn)

Số đăng ký BVTV: 4626/CNBT-CBTVT

Đơn vị ủy quyền: Fertiagro Pte. Ltd
30 Toh Guan road, #07-06 CDC Districentre, Singapore 60840

Đơn vị đăng ký: CTY CPBMC Vĩnh Phúc
ĐC Khu kinh tế KH Bãi Đông, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Sản xuất, phân phối độc quyền:
Khu CN Đức Hòa - Huyện Đức Hòa - Long An
(Xem thêm chi tiết trên phiếu KCS)

Ngày 15/07/2023

BIỆN PHÁP AN TOÀN, SƠ CỨU:

- Bảo quản xa trẻ em.
- Không hút thuốc, ăn hoặc uống trong khi sử dụng sản phẩm này.
- Khi tiếp xúc hoặc chuẩn bị thuốc: tránh hít phải thuốc, để thuốc tiếp xúc với miệng, da và mắt, mang bảo hộ lao động phù hợp.
- Nếu bị dính thuốc, ngay lập tức cởi quần áo bị dính hoặc bị bắn nhiều thuốc, rửa kỹ nhân bị dính thuốc bằng nhiều nước.
- Sau khi sử dụng: Rửa chân tay và tắm rửa, rửa sạch trang bị bảo hộ lao động.
- Giữ kín bao gói gốc được dán nhãn.
- Không sử dụng lại bao gói này vì bất kỳ mục đích nào khác.
- Để bao gói ở nơi an toàn, tránh xa thức ăn, trẻ em và động vật.
- Bảo bao gói sau sử dụng đúng nơi quy định.
- Bao gói sau sử dụng phải được rửa 3 lần.
- Trường hợp ngộ độc, cần đưa ngay nạn nhân đi cấp cứu, nhớ mang theo nhãn thuốc.

Tích hợp công nghệ xịt Drone



Xuất xứ: China
Đơn vị ủy quyền: Shanghai E-Tong Chemical Co., Ltd
Địa chỉ: 25 Lane 5598, Shenzhuan road, Song Jiang District, Shanghai, China.

Đăng ký, sản xuất, phân phối độc quyền:
Khu CN Đức Hoà - Huyện Đức Hoà - Long An
(Xem thêm chi tiết trên phiếu KCS)

HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG TỔNG HỢP

NGUY HIỂM
BẢO QUẢN XA TRẺ EM

Ohayo 240sc

SIÊU DIỆT SÂU CUỐN LÁ, ĐỤC THÂN, RẦY XANH, BỌ CÁNH TƠ (BỌ TRÍ), NHỆN, RỆP SÁP...

Thành phần:
Chlorfenapyr: 24% w/v
Phụ gia vừa đủ 1 lít

Thể tích thực: 240ml



CÔNG DỤNG

- **Chlorfenapyr** là hoạt chất thế hệ mới vô độc, thấm sâu nhanh, hoạt chất mới ức chế thần kinh làm cho côn trùng ngạt, ngừng thở và chết nhanh.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Liều lượng: Pha 25 - 30 ml thuốc với 18 - 25 lít nước để phun xịt.














Hình ảnh tham khảo một số đối tượng gây hại

Số đăng ký: 492.19/GCN-CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ
HSD: 3 năm kể từ NSX *NSX, ngày đóng gói: Xem trên bao bì
(Số 1 SX xem trên bao bì, bì kiện)



LẮC KÝ CHAI TRƯỚC KHI DÙNG









ĐỌC Ý HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG



Ngày 05/12/2023

1	Tên thương mại	☐	11	Đơn vị phân phối, địa chỉ	☐	MỘT SỐ LƯU Ý 1. Nhân phải cán màng bóng 2. Không nhận nhân cong. - Để nhân không bị cong: Để cuộn tối thiểu 12h trước khi cắt, cán màng ở nhiệt độ thấp, không bình nhân kích thước nhỏ ở 4 góc... 3. Quy định canh nếp: - Mép trái: Các nhân Jiafosina quy cách từ 450ml -> 1000ml
2	Hoạt chất - hàm Lượng	☐	12	Màu độc, biểu tượng độc	☐	
3	Số đăng ký	☐	13	Quy cách	☐	
4	Số hợp quy	☐	14	NSX, ngày đóng gói, HSD	☐	
5	Đối tượng đăng ký	☐	15	Liều lượng, cách dùng, HDATSD	☐	

BỘT XANH

BỘT VÀNG

NIKO 72WP

BÁC SĨ BỆNH CÂY

Hoạt chất:

Cymoxanil:.....8% w/w

Mancozeb:.....64% w/w

Phụ gia đặc biệt:....28% w/w

Hãng sản xuất:

Biocrop Pte., Ltd (Singapore)

NIKO 72WP là thuốc trừ bệnh có đặc tính ưu việt và hiệu quả cao. Thuốc có tác dụng rất lâu bền, giúp giảm thiểu chi phí thuốc trừ bệnh cho người trồng cây. Thuốc được sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, đảm bảo an toàn cho người trồng cây và môi trường.



Tatsu 25WP

Hoạt chất: Metalaxyl..... 25%w/w
Special Additives... 75%w/w

M8 - SINGAPORE MỚI 4.0

SẢN PHẨM THAY THẾ CHO NIKO
(Cymoxanil 8% + Mancozeb 64%)

BÁC SĨ BỆNH CÂY



Vàng Xanh

khối lượng tịnh: 500g

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Sản phẩm này thay thế cho NIKO (Cymoxanil 8% + Mancozeb 64%). Thuốc được sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, đảm bảo an toàn cho người trồng cây và môi trường. Để đạt được hiệu quả cao, người trồng cây cần tuân thủ các hướng dẫn sau đây:

Thời gian cách ly: 07 ngày.
Thời điểm phun: Khi bệnh vừa khởi phát, tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10%.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN:
Bảo quản xa tầm tay trẻ em. Không hút thuốc, ăn hoặc uống trong khi sử dụng thuốc. Tránh tiếp xúc trực tiếp với thuốc. Nếu bị dính thuốc ngay lập tức rửa sạch da bằng nước. Sau khi sử dụng, rửa sạch tay và mặt bằng nước. Giữ kín bao gói gốc được dán nhãn. Không sử dụng lại bao gói này vì bất kỳ mục đích nào khác. Để bao gói ở nơi an toàn, tránh xa thực phẩm, trẻ em và động vật. Bao gói sau sử dụng phải được rửa sạch và phơi khô trước khi tái sử dụng.

Hình ảnh tham khảo, nhận diện bệnh hại



Bổ sung Kẽm (Zn) và Mangan (Mn)

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần BMC Việt Nam. Địa chỉ: 10/10 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (0272) 377 8888. Email: info@bmc.vn. Website: www.bmc.vn. Công ty Cổ phần BMC Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty có vốn đầu tư 100% do nhà nước nắm giữ. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thuốc trừ bệnh cho cây trồng. Công ty có các chi nhánh và đại lý trên toàn quốc. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ khách hàng tốt nhất.

CÁC LỖI HAY GÂY RA NHẦM LẤN

II. CÁCH PHÂN BIỆT NHẦM LẤN

Phân biệt Niko: xanh - vàng

Quy cách 25gr: 3 biên – màu vàng/4 biên – màu xanh

Quy cách 100gr: dán decal

Quy cách 500gr – 1kg: tick trên túi